

平成 年 月 日

医療機関名

〒・住所

T E L

科名・病棟

医師名

患者氏名 男・女 明・大・昭 年 月 日生

身長 cm 体重 kg

紹介目的及び病状転院に関する患者・家族への説明内容

病名及び合併症

- | | | |
|---|---------|--------------|
| 1 | 年 月 日発症 | <(急・慢)性期・末期> |
| 2 | 年 月 日発症 | <(急・慢)性期・末期> |
| 3 | 年 月 日発症 | <(急・慢)性期・末期> |

既往症

治療経過及びリハビリテーション経過

合併症・既往症に関しても投薬や現状について記載願います

PT(実施 / 未実施)・OT(実施 / 未実施)・ST(実施 / 未実施)

----- 特記事項(該当する項目がございましたら、ご記入下さい) -----

【糖尿病】: なし・あり	インシュリン: 使用・未使用	使用インシュリン名: ()
	インシュリン使用量: ()	Hba1c値: ()
【ワーファリン】: 未使用・使用	使用量: ()	PT-INR値: ()
【入院中の感染歴】: なし・あり	原因: ()	現在のCRP値: ()、月 日

処方

患者状況

意識障害	無・有	昏睡 傾眠 混濁 その他()
精神症状 又は認知症	無・有	記憶障害 記憶力障害 見当識障害 感情失禁 夜間せん妄 不潔行為 易怒性 暴力行為 暴言 声出し 被害妄想 幻覚 抑うつ 意欲低下 徘徊 健忘 作話 その他(長谷川式スケール=)
麻痺	無・有	完全麻痺 不全麻痺 (弛緩性 痙直性 不随意運動性 失調性 強剛性 振せん性) 片麻痺(左/右) 単麻痺(部位;) 四肢麻痺
言語障害	無・有	失語症 構音障害 理解困難 理解良好 発語ほとんど無し 発語するが意味不明 発語するが聞き取りにくい 簡単な単語のみ発語可能 発語による意思疎通良好
嚥下障害	無・有	(状態;)
聴覚障害	無・有	全く聞こえない ほとんど聞こえない 補聴器を使用すれば聞こえる
視力障害	無・有	全く見えない 指数識別可能 歩行に支障あり 歩行に支障なし
拘縮	無・有	(部位;) 痛み; 無 / 有)
褥瘡	無・有	(部位;) 大きさ;)
排泄		尿意(無 / 有) 便意(無 / 有)
感染症		梅毒(無 / 有) 疥癬(無 / 有) HBV(+ / - / 未実施) / HCV(+ / - / 未実施) MRSA; 痰・尿・膿(+ / - / 未実施)
その他		気管切開(無 / 有) 人工肛門(無 / 有) 皮膚疾患(無 / 有;) 酸素投与(無 / 有; l/分) 吸引(無 / 有; hr毎あるいは 回/日) 人工呼吸器(無 / 有) 身体抑制(無 / 有; 体幹/ミトン/その他:)

ADL(日常生活動作)等

移動	歩 行	自立 自力で可能だが時間を要す 杖歩行 つたい歩き 歩行器 歩行不能
	車椅子	移乗(自立 / 要介助) 操作(自立 / 要介助)
起坐		自立 一部介助 全介助
座位保持		不能 or 可能(30分以上 / 30分未満); 背もたれ(要 / 不要)
寝返り		自立 一部介助 全介助
食事		経口摂取(自立 / 自力で可能だが時間を要す / 一部介助 / 全介助) 義歯(有 / 無)
栄養	検査値	TP g/dl Alb g/dl Hb g/dl
	摂取量	76%以上 75~26% 25%以下
	食形態	主食(飯 / 粥 / ミキサー / その他) 副食(普通 / キザミ / みじん / ミキサー / その他)
	補給法	経管(鼻腔 / PEG / その他) 併用 静脈 内容()
排泄		自立 自力で可能だが時間を要す ポータブルトイレ(介助要 / 否) 差し込み便器使用中 オムツ使用 バルーン挿入中
更衣		自立 自力で可能だが時間を要す 一部介助 全介助
洗面		自立 自力で可能だが時間を要す 一部介助 全介助
入浴		自立 家庭浴 シャワー浴 機械浴 清拭
ナースコール		可能(呼べている / 呼べていない) 不能

* 評価が行われた場合はご記入ください。

FIM あるいは BI =	障害老人の日常生活自立度 (寝たきり度)判定基準 = ランク	痴呆性老人の日常生活自立度 判定基準 = ランク
------------------	-----------------------------------	-----------------------------