

# お薬の説明書

処方せん区分

診療科

病棟

病室

オーグ 日時

医師

様

発行日

今回あなたに処方されたお薬です。他の病院にかかる際や薬局でお薬をお求めになる時には、この説明書をお見せ下さい。尚、お薬についての疑問やさらに詳しく知りたい方は、医師・薬剤師にご相談ください。

 <p>直径 7.1 mm 厚さ 3.7 mm</p>	お薬の名前	ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」					(ドネペジル 5)
	飲み方/使い方	1日1回 朝食後					
	日数/回数		朝食後				
	7日分		1				錠


【効能効果】 脳の神経刺激を伝える物質を増やして伝わりをよくし、脳の働きを活発にする作用があります。

【副作用】 服用中、動悸、めまい、失神、胸痛、呼吸困難、腹痛、便に血が混じる、黒い便が出る、吐き気、嘔吐、食欲不振、黄疸、けいれん、頭痛、意識障害、手足のまひ、舌がもつれる、手指のふるえ、動作がゆっくりになる、口・舌・手足が無意識に動く、発熱、じっとしている、言葉が少なくなった、筋肉がこわばる、物が飲み込みにくい、発汗、筋肉痛、脱力感、赤褐色尿、むくみ、尿量減少、青あざ、歯ぐきや鼻からの出血などの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

 <p>長径 13.1 mm 短径 7.1 mm 厚さ 2.5 mm</p>	お薬の名前	ドパコール配合錠L100					( DK 026: )
	飲み方/使い方	1日3回 朝・昼・夕食後					
	日数/回数		朝食後	昼食後	夕食後		
	7日分		1	1	1		錠


【効能効果】 手や指のふるえや、筋肉のこわばり、動きにくかったり、動きが遅くなるなどの症状を改善する作用があります。

【副作用】 服用中、高熱、意識障害、筋肉がこわばる、ふるえ、物が飲み込みにくい、脈が速くなる、発汗などの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

 <p>直径 7.1 mm 厚さ 3.5 mm</p>	お薬の名前	ノイロトロピン錠					( Z 111: )
	飲み方/使い方	1日3回 朝・昼・夕食後					
	日数/回数		朝食後	昼食後	夕食後		
	7日分		1	1	1		錠

【効能効果】 痛みをやわらげる作用があります。

【副作用】 服用中、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、食欲不振、褐色尿、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、皮膚がかゆいなどの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

 <p>直径 7.0 mm 厚さ 3.4 mm</p>	お薬の名前	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」					( SW PLZ:75 )
	飲み方/使い方	1日2回 朝・夕食後					
	日数/回数		朝食後		夕食後		
	7日分		1		1		錠

【効能効果】 胃の粘膜を保護し、修復する作用があります。  
胃潰瘍の治療に用いられます。

【副作用】 服用中、全身倦怠感、疲れやすい、動悸、息切れ、青あざがでやすい、歯ぐきや鼻からの出血、発熱、のどが痛いなどの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。